





## Medicatie

### MEDICATIE

- a. Pijnstilling:
- Meloxicam: bv. Emdocam, Meloxidolor, Melovem, Metacam
  - Ketoprofen: bv. Rifen
- b. Lokale verdoving:
- Pronestestic (40mg/ml)
  - Procaine hydrochloride 4% adrenaline
  - Procaine hydrochloride 4%
  - Procainii chloridum 4% + adrenalinum

MEDICATIE	DOSIS	WACHTTERMIJN VÓÓR CASTREREN	WACHTTIJD TOT SLACHT	BEWAREN
 <b>PRONESTESIC</b>	Max. 0,5 ml per teelbal	Min. 5 min., max. 45 min.	0 dagen	Houdbaarheid na aanprikken: 28 dagen  Bewaren bij kamer- temperatuur (< 25°C)
 <b>PROCAINE HYDROCHLORIDE 4% ADRENALINE</b>	Max. 0,5 ml per teelbal	Min. 5 min., max. 90 min.	0 dagen	Na openen onmiddellijk gebruiken  Bewaren bij 2-8°C (koelkast) + beschermen tegen licht
 <b>PROCAINE HYDROCHLORIDE 4%</b>	Max. 0,5 ml per teelbal	Min. 5min., max. 30 min.	0 dagen	Na openen onmiddellijk gebruiken  Bewaren bij 2-8°C (koelkast) + beschermen tegen licht
 <b>PROCAINII CHLORIDUM 4% + ADRENALINUM</b>	Max. 0,5 ml per teelbal	min. 5 min., max. 30 min.	3 dagen	Houdbaarheid na aanprikken: 28 dagen  Bewaren bij 2-8°C (koelkast) + beschermen tegen licht

– Lokale verdoving mét adrenaline heeft de voorkeur –

#### Verdovende middelen:

- Uitsluitend ter beschikking door de bedrijfsdierenarts (T&V document!)
- Uitsluitend mits een schriftelijk akkoord
- Uitsluitend de hoeveelheid nodig voor biggencastratie
- Registratie in het geneesmiddelenregister
- Verdoving in de voorraad van het varkensbedrijf = VERBODEN!

Deze overzichts fiches zijn opgesteld in het kader van biggencastratie onder lokale verdoving met pijnstilling.

– [www.belpork.be](http://www.belpork.be) –